T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ RUHSAT BELGESİ

İMAL

Ruhsat No: **11259**	Ruhsat Tarihi: **22.11.2018**
Ticari Adı	: **MENTA PRELÜD**
Grubu	: Fungisit
Aktif Madde ve Oranı	: 300 g/l Pyrimethanil
Formülasyon Şekli	: SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre)
Görünüşü	: Kirli Beyaz Kıvamlı Sıvı
Ruhsat Sahibi Firma Adı ve Adresi	: MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:1 Huzurkent Tarsus / MERSİN
Üretici Firmanın Adı ve Adresi	: MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1 Huzurkent / MERSİN
Üretim Tesisinin, Üretim İzin Tarih ve Numarası	: 14.11.2014/31-326
Ruhsat Belgesinin Geçerli Olduğu Süre	: **22.11.2028 (Yirmiiki Kasım İkibinyirmisekiz)** tarihine kadar
Düzenlenme Tarihi ve Nedeni	: 22.11.2018, Emsal

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye'de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.

Dr. Yunus BAYRAM
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve No'su : 22.11.2018/11259

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	**ZARARLI ORGANİZMA ADI**	**UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ**	**SON UYGULAMA İLE HASAT ARASI SÜRE**
*Bağ	Bağda Kurşuni Küf *(Botrytis cinerea)*	100 ml / 100 L su	21 gün
Domates	Sebzelerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)	125 ml / 100 L su	3 gün
Elma	Elma Karalekesi *(Venturia ineaqualis)*	50 ml / 100 L su	14 gün

***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.**

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYONU: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulama da iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün erken saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinasının Temizliği
Uygulamanın tamamlanmasından sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda Kurşuni Küf:

Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; 1. Uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında, 2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir. Ege, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgelerinde; 1. Uygulama: Çiçeklenmeden hemen önce, 2. Uygulama: kapalı salkım döneminde, 3. ve diğer uygulamalar: Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

22 Kasım 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

MENTA®

MENTA PRELÜD

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	D1:9	FUNGİSİT (Mantar İlacı)

300 g / L Pyrimethanil

-Önce etiketi okuyunuz.
-Evde kullanmayınız.
-Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
-Bitki koruma ürününün buhar ve zerreciklerini solumayınız.
-Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz. Sigara içmeyiniz.
-Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
-Bitki koruma ürününün buharını ve zerrelerini teneffüs etmeyiniz.
-Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 12 saat insan ve hayvan sokmayınız
-İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının ¼'ün kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Deri ve mukozayı tahriş eder. Baş ağrısı, halsizlik, ishal ve metahemoglobinaya bağlı cyonosis'e neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
Gözler ile teması olması halinde: Gözleri, gözkapakları açık ve nazik şekilde en az 15 dakika sürekli olarak yıkayın. Gözde kontakt lens var ise, lensleri yıkamaya başladıktan 5 dakika sonra çıkartın daha sonra gözleri yıkamaya devam edin. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Net Miktarı :
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER: Pyrimethanil

ZARARLILIK İŞARETİ

ZARARLILIK İFADELERİ (H)
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)
P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P391: Dökküntüleri toplayın.
P501: İçeriği/kabı kimyasal atık olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
-Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
-Yeni ilaçlanan sahada hayvan otlatılmamalı, buradan yem ve gıda maddesi toplanmamalıdır.
-BKÜ artıklarının imhası esnasında sulama veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ilaçla kirletmeyiniz.
-BKÜ artıklarını ve ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz. -Evcil hayvanları ilaçlanmış sahadan uzak tutunuz. Yem ve gıda maddelerini ilaçla kirletmeyiniz
- Arılar için zehirlidir Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürününün kalitesini garanti ederler. Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı taktirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün hatalı depolanmasından, hatalı doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

MENTA®
TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
No: 1 Huzurkent / / MERSİN
Tel:+90 324 676 45 95-96 Fax:+90 324 676 45 97
www.mentatarim.com - menta@mentatarim.com
Uray V.D.: 615 002 8377 Tic. Sic. No:32260
Faruk DENİZ
Şirket Vekili

Domateste Kurşuni Küf:
Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalara 10 gün arayla hastalığın seyrine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama yapacak şekilde yapılmalıdır.

Elma Karalekesi:
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünün etki süreleri dikkate alınarak (10-14 gün ara ile) uygulanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: MENTA PRELÜD adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D1:9 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENTA PRELÜD 'nın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup D1:9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Menta Prelüd diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırarak kullanılmaz.

MENTA®

MENTA PRELÜD

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	D1:9	FUNGİSİT (Mantar İlacı)

300 g / L Pyrimethanil

Deri ile teması olması halinde: Temas eden bölgeyi acil olarak, en az 15 dakika iyice yıkayın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın.
Solunum: Etkilenen kişinin sakinleşmesini sağlayın ve kişiyi temiz havaya taşıyın. Kişi nefes alamıyorsa, acilen bir ambulans çağırın ve kişiye suni teneffüs yapın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın.
Sindirim: Acil olarak medikal ve zehir kontrol merkezlerini arayın. Etkilenen kişi kusmaya zorlamayın. Kişi eğer içebilecek durumdaysa, kişinin ağzını çalkalayın ve 200-300 ml kadar suyu yavaşça içirin. Bilinci açık olmayan kimseye ağızdan bir şey vermeyin.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Hastaya oksijen veriniz. Askorbik asit veya methylene blue kullanınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel:114
Sadece zehirlenme durumlarında arayınız.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:
MENTA TARIM İLAÇLARI San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:1
Huzurkent / MERSİN
Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

ÜRETİM TESİSİ:
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:1
Huzurkent / MERSİN
Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

MENTA®
TARIM İLAÇLARI SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
No: 1 Huzurkent / MERSİN
Tel:+90 324 676 45 95-96 Fax:+90 324 676 45 97
www.mentatarim.com menta@mentatarim.com
Uray V.D. : 615 002 [illegible] Tic. Sic. No:32260
Faruk DENİZ
Şirket Vekili

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
22 Kasım 2018

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.