



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü


## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ RUHSAT BELGESİ

### İMAL

Ruhsat No:	6262	Ruhsat Tarihi:	04.03.2008
Ticari Adı		: MENTA FİX	
Grubu		: Bitki Gelişim Düzenleyicisi (BGD)	
Aktif Madde ve Oranı		: 50 g/l Mepiquat Chloride	
Formülasyon Şekli		: SL (Suda Çözünen Konsantr)	
Görünüşü		: Pembe Renkli Berrak Sıvı	
Ruhsat Sahibi Firma Adı ve Adresi		: MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:1 Huzurkent Tarsus / MERSİN	
Üretici Firmanın Adı ve Adresi		: MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1 Huzurkent / MERSİN	
Üretim Tesisinin, Üretim İzin Tarih ve Numarası		: 22.05.2006/09-176	
Ruhsat Belgesinin Geçerli Olduğu Süre		: 04.03.2033 ( Dört Mart İkbinoTuzüç ) tarihine kadar	
Düzenlenme Tarihi ve Nedeni		: 28.08.2023, Temdit	

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye'de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.



  
Doç. Dr. Yunus BAYRAM  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarihi ve No'su : 04.03.2008 / 6262

#### ÜRÜNÜN KULLANILACAK İTİBİTLER:

Bitki Adı	Uygulama Amacı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Parmuk	Aşırı büyümeyi önler, erkencilik sağlar.	Çiçek başlangıcı ve çiçek doruğu arasında veya tarak başlangıcından itibaren 25-50 ml/da, 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır.
Sogan ve Sarımsak	Verim artışı sağlar.	Tohumdan üretilen soganda ekimden 3-3,5 ay sonra, sogan 4-5 yapraklı iken, arpacıklan üretilen soganda ekimden yaklaşık 2,5 ay sonra 100 ml/da
Yerfıstığı	Verim artışı sağlar.	Sarımsakta uygulama dikimden yaklaşık 2,5 ay sonra 150 ml/da

#### ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım deponu ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

#### KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

##### Parmukta kullanımı:

Parmukta arzu edilmeyen aşırı büyümeyi önler ve gelişmeyi düzenler. Parmuk tarhalarını yabancısı ot ve hasere mücadelesi zamanında yapılmalıdır. Bitkinin normal gübre ihtiyacı karşılanmalıdır, normal sulama düzenine uyulmalıdır.

Koyu yeşil yaprak rengi, boğum atarlarının kısalması ile buna bağlı olarak derli toplu bir bitki olur. Böylece sıra araları daha geç kapanır. Güneş ışınları bitkiye daha iyi nüfuz eder ve alt dallardaki kozalara kadar özüde azalır. Hasere kontrolü ve mücadelesi daha basit ve etkili olarak yapılabilir. Daha az tarak ve elma En uygun kullanma zamanı çiçeklenme başlangıcı ile bunu takip eden iki haftalık süre içerisinde dir. Yükarıda belirtilen uygulama zamanı sulama imkanlarına göre 3-5 gün önceye veya sonraya alınabilir.

# MENTA

## MENTA FIX

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu - Bitki Gelişim Düzenleyicisi

50 g/l Mepiquat chloride

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDE UZAK TUTUNUZ.
- BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEZİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE GEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

#### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4 üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik görülebilir.

#### İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

**Gözler:** Etiketlenen gözleri, gözkapakları açık ve nazik şekilde en az 15 dakika süreli olarak yıkayın. Gözde kontakt lens var ise, lensleri yıkamaya başladıktan 5 dakika sonra çıkartın daha sonra gözleri yıkamaya devam edin. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon:114).

**Deri:** Temas eden bölgeyi acil olarak, en az 15 dakika iyice yıkayın. Mantar hastalığı için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın. (Telefon: 114).

Net Miktarı :  
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV Dahil) :  
İÇİNDEKİLER: Mepiquat chloride

#### ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmasından eleğmeyin.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzüz koruyucu kullanın.
- P501 : İçerdiği/kabı kimyasal atık olarak bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boş ürün ambalajlarını başka amaç için kullanmayınız. Usulüne uygun imha ediniz.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın hatalı depolanması veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak sorunlardan mesul tutulamaz.

TARİMLİK İLAÇLARI AN. ve TİC.LTD. STI.  
Mersin-Teşvik Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde  
No: 1 Huzukent / MERSİN  
Tel:+90 312 5 976 45 58 Fax:+90 324 676 45 97  
www.menta.com.tr - menta@mentatarm.com  
Urşy D., 615 882 87 77 Tic. Sic. No:32288

**FARK DENİZ**  
Şirket Vekili

14 Ağustos 2018  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

**Dr. Yunus BAYRAK**  
Genel Müdür Yardımcısı

Genel olarak bir defada ve 100 ml/da dozda uygulanır. Uygulanan tarlada anolun 10-15 dereceye vejetatif bir gelişme olursa, birinci tabakattan 3-4 hafta sonra 50 ml/da dozda ikinci bir uygulama yapılması tavsiye edilir.

**Parçallı uygulama:** Yüksek dozda bir defa kullanımı yerine bu dozun 3 veya 4'e bölünerek pamuğun tarak döneminden itibaren düşük dozlarda kullanılması da mümkündür. Böylece tarak başlangıcından itibaren bitkiyi kontrol altına alır ve tarak döklümünü azaltır. Parçallı uygulama sayesinde sulama imkanı kısıtlı veya düzensiz olan veya fazla boylanmayan pamuklarda da kullanılabilir ve sağladığı faydalardan istifade edilebilir.

Parçallı uygulamada dozları:

1. uygulama: 25 ml/da (Tarak başlangıcı)
2. uygulama: 25-50 ml/da (1. suyun öhüne veya gelişme zayıfısa sudan sonra)
3. uygulama: 25-50 ml/da (2. uygulamadan 7-14 gün sonra veya 2. suyun öhüne)
4. uygulama: 25 ml/da (Pamukta büyüme devam ediyorsa yapılır).

Yer aletleri ile dekara en az 20 litre su ile atılmalıdır veya uygulama zamanı diğer haşere ilaçlarının uygulama zamanına tesadüf ediyorsa haşere ilaçları ile karışım halinde kullanılmalıdır.

#### **Soğan ve sarımsakta kullanımı:**

Soğan ve sarımsakta verim artışı sağlar. Tohumdan baş soğan üretiliyorsa en uygun uygulama zamanı ekimden 3-3,5 ay sonradır. Bu dönemde soğan genellikle 4-5 yapraklı olup, 20-25 cm boydadır ve baş bağlamaya başlamıştır. Ayrıca soğan baş soğan üretiliyorsa, uygulama zamanı ayrıca ekimden yaklaşık 2,5 ay sonradır. Sarımsakta uygulama zamanı ayrıca soğanında olduğu gibidir. Gerek soğan ve gerekse sarımsakta dikkat edilmesi gereken husus baş bağlama başlangıcında kullanılmasıdır.

#### **Yerfıstığında kullanımı:**

Yerfıstığında verim artışı sağlar. Yapılan denemeler verim artışının %25-30 oranında olduğunu göstermiştir. Çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçek dönemi arasında kullanılabilir. En iyi netice tam çiçeklenme döneminde yapılan uygulamalardan alınmıştır. Yerfıstığında 1 defada ve 150 ml/da dozda kullanılır.

#### **KARİŞİLBİLİRLİK DURUMU:**

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

**MENTA**

**MENTA FIX**

Suda Çözünen Konsantrte (SL)

Gubu - Bitki Gelişim Düzenleyicisi

50 g/l Mepiquat chloride

**Solumu:** Etkilenen kişinin sakınlaşmasını sağlavin ve kişiyi temiz havaya taşıyın. Kişi nefes almıyorsa, acilen bir ambulans çağırın ve kişiye suni teneffüs yapın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114).

**Sindirim:** Acil olarak medikal ve zehir kontrol merkezlerini arayın. Etkilenen kişi kusmaya zorlamayın. Kişi eğer içebilecek durumdaysa, kişinin ağızını çalkalayın ve 200-300 mL kadar suyu yavaşça içirin. Bilinci açık olmayan kimseye ağızdan bir şey vermeyin.

**Medikal Yetkiliye Notlar:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayın. Tahşişlerin tedavisinde antiktitermikler veya steroid pomatlar veya sistemik steroidlerle tedavi tavsiye edilir.

#### **ANTİDODU VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel:114**

Sadece zehirlenme durumlarında arayınız.

14 Ağustos 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
CİDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Yunus BARRAM  
Genel Müdür Yardımcısı



**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**  
MENTA TARIM İLAÇLARI San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi  
No:1 Huzurkent / MERSİN  
Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
MERSİN- TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. C  
No: 1 Huzurkent / MERSİN  
Tel: +90 324 676 45 95 -96 Fax: +90 324 676 45 97  
www.mentatarim.com.tr - menta@mentatarim.com.tr  
Ünvan Y.D.: 615 001 5377 Tic. Sic. No: 5226

**FARUK DENİZ**  
Şirket Yetkilisi