



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI

T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
RUHSATI

İMAL

Ruhsat No: 9930.....	Ruhsat Tarihi:.....	24.11.2014
Ticari Adı	:	MENTA PRESTO.....
Aktif Madde ve Oranı	:	240 g/l Spiromesifen.....
Grubu	:	Akarisit.....
Fiziki Hali	:	Grimsi beyaz kıvamlı sıvı.....
Ruhsat sahibinin Adı ve Adresi	:	MENTA TAR.İL.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.Mersin-Tarsus Org.San.Böl.1.Cad.No:1 Huzurkent-Tarsus/MERSİN
Fabrika veya İmalathanenin işletme İzni Tarih ve Numarası	:	14.11.2014/ 31-326.....
Fabrika veya İmalathanenin adresi	:	MENTA TAR.İL.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.Mersin-Tarsus Org.San.Böl.1.Cad.No:1 Huzurkent-Tarsus/MERSİN
Ruhsatının geçerli olduğu süre	:	24.11.2024 (Yirmidört Kasım İkbinyirmidört)..... Tarihine kadar
Düzenleme Tarihi ve Nedeni	:	24.11.2014 Emsal.....

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye'de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.



Ahmet KAVAK
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve No'su :

MENTA®

Net Miktarı :
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV Dahil) :

MENTA PRESTO

Süspansiyon Konsantre (SC)

İÇİNDEKİLER: Spiromesifen içerir.
ZARARLILIK İŞARETLERİ

GRUBU	23	AKARİSİT (Kırmızıörümcek)
-------	----	------------------------------

240 g / L Spiromesifen



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- EUH208: Spiromesifen içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

- P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
- P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
- P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P302+P352: Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.
- P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
- P363: Kirletmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
- P391: Döküntüleri toplayın.
- P501: İçeriği/kabı kimyasal atık olarak bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ve ANTİDOTU:

Gözler: Etkilenen gözleri, gözkapakları açık ve nazik şekilde en az 15 dakika sürekli olarak yıkayın. Gözde kontakt lens var ise, lensleri yıkamaya başladıktan 5 dakika sonra çıkartın daha sonra gözleri yıkamaya devam edin. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezini arayın (Telefon:114).

Deri: Temas eden bölgeyi acil olarak, en az 15 dakika iyice yıkayın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezini arayın (Telefon:114).

Solumum: Etkilenen kişinin sakinleşmesini sağlayın ve kişiyi temiz havaya taşıyın. Kişi nefes almıyorsa, acilen bir ambulans çağırın ve kişiye suni teneffüs yapın.

Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezini arayın (Telefon: 114).

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdakken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanınca yada karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılır.

KALİBRASYON: İlaçlama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür, Yarımcı

10 Mayıs 2018
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MENTA
TARIM İLAÇLARI S.M. ve TİC.LTD.ŞTİ.
Mersin-Tarsus Ormanize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
No: 1 Hızlı Servis / MERSİN
Tel: +90 324 676 45 95 / Fax: +90 324 676 45 97
www.mentatakim.com / menta@mentatarim.com
UPA01616000 / Mentatarim No:32250

Şirket Zekili

ilaçlama Makinasının Temizliği:

ilaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamuk – Kırmızıörümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Patlıcan, Domates – **Kırmızıörümcekler:** Domates, patlıcan ve hiyarda yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates – Tütün beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasalmücadele uygulanır.

Karpuz Kırmızıörümcekler: Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adetine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğu müddedele karar verilir.

Çilek – Kırmızıörümcekler:

Erken dönem uygulaması: Kırmızı örümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeyen önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.


Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu – Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkilerin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Karanfil (Sera) – İki noktalı kırmızıörümcek: Süs bitkisi ekim alanları sık sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında kırmızıörümcek aranır. Lokal bulaşma tespit edildiğinde ilaçlı mücadele sadece buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yaygın bir bulaşmaya rastlandığında tamamı ilaçlanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ: MENTA PRESTO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **MENTA PRESTO'nun** aynı sezonda içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Birçok insektisit, fungisit ve yaprak gübrelere ile karışabilir, ancak uygulamadan önce bir ön karışım testi yapılmalıdır.



10 Mayıs 2018

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEPOLAMA DURUMU:

Normal depolama (serin ve kuru şartlar) koşullarında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması ve uygulamadaki eksiklikler neticesinde oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

MENTA TARIM İLAÇLARI San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:1
Huzurkent / MERSİN

Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114

MENTA®
TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
No: 1 Huzurkent / MERSİN
Tel: +90 324 676 45 95-96 Fax: +90 324 676 45 97
www.mentatirim.com menta@mentatirim.com
Uray V. 0092377 Tic. Sic. No: 32760

FAHRETTİN DENİZ
Sirket Vekili

MENTA®

MENTA PRESTO
Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	23	AKARİSİT (Kırmızıörümcek)
-------	----	------------------------------

240 g / L Spiromesifen