



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI

T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü


**BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ
RUHSAT BELGESİ**

İMAL

Ruhsat No: **11038** Ruhsat Tarihi: **24.01.2018**
Ticari Adı : **TORSION**
Grubu : Akarisit
Aktif Madde ve Oranı : 550 g/l Fenbutatin Oxide
Formülasyon Şekli : SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre)
Görünüşü : Kirli Beyaz Sıvı
Ruhsat Sahibi Firma Adı ve Adresi : MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:1
Huzurkent Tarsus / MERSİN
Üretici Firmanın Adı ve Adresi : MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1
Huzurkent / MERSİN
Üretim Tesisinin, Üretim
İzin Tarih ve Numarası : 14.11.2014/ 31- 326
Ruhsat Belgesinin Geçerli Olduğu Süre : **24.01.2028 (Yirmidört Ocak İkbinyirmisekiz)**
tarihine kadar
Düzenlenme Tarihi ve Nedeni : 24.01.2018, Emsal

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye'de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.




Dr. Yunus BAYRAM

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve No'su :

MENTA

TORSİON

Süspansiyon Konsantre (SC)

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ELMA	Akdiken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)	30 ml/ 100 l su	10 Gün
	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)		
	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)		
	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus cinnabarinus</i> ,		
PAMUK	<i>Tetranychus urticae</i>)	135 ml/da	10 Gün
YERFİSTİĞİ	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	135 ml/da	10 Gün
SOYA	Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	135 ml/da	10 Gün

GRUBU	12 B	AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
-------	------	------------------------------------

550 g / L Fenbutatin- Oxide

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün buhar ve zerreciklerini solumayınız.

Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey

yemeyiniz. Sigara içmeyiniz.

Deri ve göz ile temasından kaçınınız.

Bitki koruma ürününün buharını ve zerreciklerini tenefüs

etmeyiniz.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan

sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım

talimatına uyunuz.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ilacın boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su

koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına

boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Hareketlerde uyusukluk, adale

kasılmaları, denge bozukluğu, solunum zorluğu, göz yaşı ve

sümük artışı.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma-Kırmızıörümcek ve akarlar: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Pamuk-Kırmızı örümcekler: Mücadele zamanını belirlemesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara BKU uygulaması yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama 4/5deniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprak incelenir. Yaprak başına 15 ve üzerinde kırmızı örümcek tespit edilmesinde halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplandıktan hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Net Miktarı :
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:

Fenbutatin- Oxide

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H330: Solunması halinde öldürücüdür.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P102: Çocukların erişmeyeceği yerde saklayınız.

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyiniz.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayınız.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.

P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanınız.

P302+P352: Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayınız.

P304+P340: Solunduğunda: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartınız ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutunuz.

P305+P351+P338: Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.

P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.


P337+P313: Göz tahriş kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P391: Döküntüleri toplayınız.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabi sıkıca kapalı tutunuz.

P501: İçeriği/kabi kimyasal atık olarak bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.



24 Ocak 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

MENTA
TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
No: 1 / Akurköy / MERSİN
Tel: +90 324 676 45 94-96 Fax: +90 324 676 45 97
www.mentatarim.com - menta@mentatarim.com
Urşay V.D.: 615 092 8377 Tic. Sic. No: 32260

Faruk DENİZ
Şirket Vekili

Yerleştiği-Kırmızıörmücekler: Yapılacak sayımlarda yaprak başına 8-10 adet kırmızıörmücek tespit edilmişse ilaçlama yapılmalıdır.
Soya-Kırmızıörmücek: Baklılar olgunlaştıktan sonra ilaçlama yapılmamalıdır. Bir yaprakta ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege Bölgesi'nde 10 adet kırmızıörmücek bulunduğu kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: TORSİON adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 12/B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TORSİON 'nun aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 12/B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Yüksek alkali özellik gösteren maddeler hariç olmak üzere insektisit ve fungusitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Kullanmadan önce karışım testi yapılmalıdır.

MENTA®

TORSİON

Süspansiyon Konsantr (SC)

GRUBU	12 B	AKARİSİT (Kırmızıörmücek İlaç)
-------	------	-----------------------------------

550 g / L Fenbutatin- Oxide

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Gözler: Etkilenen gözleri, gözkapakları açık ve nazik şekilde en az 15 dakika sürekli olarak yıkayın. Gözde kontakt lens var ise, lensleri yıkamaya başladıktan 5 dakika sonra çıkartın daha sonra gözleri yıkamaya devam edin. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114).

Deri: Temas eden bölgeyi acil olarak, en az 15 dakika iyice yıkayın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114).

Solumun: Etkilenen kişinin solumasını sağlayın ve kişiyi temiz havaya taşıyın. Kişi nefes alamıyorsa, acilen bir ambulans çağırın ve kişiye suni teneffüs yapın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114).

Sindirim: Acil olarak medikal ve zehir kontrol merkezlerini arayın. Etkilenen kişi kusmaya zorlamayın. Kişi eğer içebilecek durumdaysa, kişinin ağzını çalkalayın ve 200-300 mL kadar suyu yavaşça içirin. Bilinci açık olmayan kimseye ağızdan bir şey vermeyin.

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Sadece zehirlenme durumlarında arayınız.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Baklılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Baklılara zehirlidir. Su kaynaklarına göllere, akarsulara buluşturmayınız.
- Tavsiyelere uygun kullanılmadığında fitotoksik değildir.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinden hoşgörüsü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaclarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaclarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

MENTA TARIM İLAÇLARI San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi No:1
Huzurkent / MERSİN

Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

MENTA®
TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi
No: Huzurkent / MERSİN
Tel:+90 324 676 45 95-96 Fax:+90 324 676 45 97
www.mentatarim.com.tr e-posta:mentatarim.com.tr
Uray V.D.: 045 002 877 7/c. Sic. No:32260

FARUK DENİZ
Şirket vekili

(Handwritten signature)



24 Ocak 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR